

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA ŽILINA
Jedľová 44, 010 04 Žilina

Mestské a obecné úrady
v okresoch Žilina a Bytča

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
č. z.: 505/2025
č. s.: 569/2025-500

Vybavuje/Linka
MVDr. Šeriková

Žilina
25.03.2025

Vec: Žiadosť o súčinnosť.

V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť z dôvodu potvrdenia slintačky a krívačky v 3 chovoch hovädzieho dobytku na území Slovenska v okrese Dunajská Streda. V tejto súvislosti nariadil dňa 21.03.2025 hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky chovateľom, majiteľom, držiteľom vnímavých zvierat „Mimoriadne núdzové opatrenia – slintačka a krívačka 2025“, ktoré sú zverejnené, podobne ako aj ďalšie aktuálne informácie na stránke www.svps.sk.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o informovanie obyvateľov Vašej obce/mesta Vami obvyklým spôsobom (obecný rozhlas, vývesná informačná tabuľa, webová stránka a pod.), aby držiteľia (majitelia, chovatelia) zvierat dodržiavali najmä:

- **Zákaz** akéhokoľvek premiestňovania hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri (nákup, predaj týchto zvierat),
- **Zákaz** organizácie všetkých hromadných podujatí, trhov, výstav a zvodov hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov;
- **Zákaz** vstupu nepovolaných osôb do chovov hovädzieho dobytku, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri,

- používať pri vstupoch do budov a výstupoch z budov na ustajnenie hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri a do samotného chovu vhodné prostriedky na dezinfekciu;
- osoba vstupujúca do chovu alebo opúšťajúca chov hovädzieho dobytku, oviec, kôz a ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri musí dodržať hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizika šírenia vírusu slintačky a krívačky (najmä dodržiavanie osobnej hygieny, čistenia a dezinfekcie použitej obuvi a odevu)
- dopravné prostriedky opúšťajúce chov pred opustením chovu dôkladne dezinfikovať;
- čistenie, dezinfekciu a ošetrovanie všetkého vybavenia, ktoré bolo použité pri manipulácii s hovädzím dobytkom, ovcami, kozami a ošípanými alebo materiálom, ktoré môžu byť kontaminované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné čo najskôr po kontaminácii;
- bezodkladne hlásiť podozrenie na chorobu s príznakmi slintačky a krívačky na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Žiline,
- uhynuté zvieratá likvidovať výlučne v spracovateľskom zariadení (kafilérii).

Poučenie o chorobe:

Slintačka a krívačka (SLAK) je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce . Všetky druhy zveri a antilopy, ako aj slon a žirafa sú vnímavé na slintačku a krívačku.

V súčasnom období je vakcinácia proti tejto chorobe v EÚ zakázaná

Chorobnosť zvierat môže dosiahnuť až 100 %, úmrtnosť je nízka, vysoká úmrtnosť býva u mladých zvierat. Zdrojom infekcie sú choré živé, alebo mŕtve zvieratá, ich sekréty, exkréty a všetky produkty, pochádzajúce z nich, vírus je vylučovaný najmä slinami, lymfou a tkanivom odpadávajúcich stien z prasknutých pľuzgierov z jazyka, nozdier, pysku, z nôh a vemena, mliekom, močom, výkalmi, semenom, vydychovaným vzduchom.

Okrem priameho prenosu vírusu kontaktom chorého zvieratá so zdravým sa SLAK šíri najmä **nepriamym prenosom, pomocou živých a neživých vektorov**. Ako neživé vektory sa môžu uplatniť krmivo, podstielka, hnoj, močovka, dopravné prostriedky, prach. Význam pre **pasívny prenos nákazy má človek**.

Mimoriadne riziko predstavujú:

- Mäso a produkty z chorých alebo nakazených zvierat (mlieko, krv, kosti, vnútorné orgány, koža, paznechty, rohy, výrobky, odpad).
- Živé pasívne vektory: všetky druhy zvierat, obzvlášť tie, ktoré sa pohybujú v blízkosti chovných priestorov – domáce, voľne žijúce zvieratá vrátane hlodavcov, vtákov, hmyzu.
- Slintačka a krívačka je charakterizovaná horúčkou (41 °C) a tvorbou charakteristických lézií – pľuzgierov (vezikúl, áft), obsahujúcich slamovo žltú farebnú tekutinu (lymfu), najčastejšie sa vyskytujú na sliznici dutiny ústnej (sprievodným príznakom je zápal dutiny ústnej a typické slintanie), lícach, d'asnách, jazyku, rypáku, vemene, medziprstových priestoroch, následkom čoho je krívanie, postihnutie dutiny ústnej má za následok nechutenstvo a sťažený príjem krmiva.

Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom

MVDr. Lívia Čičková
riaditeľka RVPS Žilina

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Žilina.

Príloha: Dezinfekčné prostriedky účinné na SLAK